

جدول عقاقير فيروس نقص المناعة (HIV) لعام ٢٠١١ العقاقير المعتمدة لعلاج فيروس نقص المناعة (HIV)

مثبطات المنتسخة العكسية النوكليوزيدية/النوكليوتيدية (NRTI)

العقار	الجرعة	الأعراض الجانبية ومعلومات أخرى مهمة
 Emtriva Gilea Sciences الاسم العلمي: زيدوفويدين	كبسولة ٢٠٠ ملجرام مرة واحدة في اليوم. ومتوفر في شكل شراب.	الأعراض الجانبية: صداع، إسهال، غثيان، شحوب في الجلد ما بين خفيف إلى مُعتدل، واحمرار. يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه. عقار Emtriva مشابه جدًا لعقار Epivir . المرضى المقاومون لعقار Epivir لديهم على الأرجح مقاومة لعقار Emtriva .
 Epivir ViiV Healthcare الاسم العلمي: لاميفودين	قرص ٣٠٠ ملجرام مرة واحدة في اليوم أو قرص ١٥٠ ملجرام مرتين يوميًا. ومتوفر في شكل شراب.	الأعراض الجانبية: صداع، إعياء، غثيان، إسهال، أرق، انخفاض كرات الدم البيضاء (قلة العدلات)، انخفاض كرات الدم الحمراء (الأنيميا "فقر الدم")، التهاب البنكرياس، وتساقط الشعر. يمكن أن "تعود" مقاومة فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) لعقار الأزيدوثايميدين (AZT)، إذا تم استخدامهما معًا. تجنب تعاطي الكحول. تحقق من ثلاثي الغليسريد، خاصة في الأطفال، للتحقق من مخاطر التهاب البنكرياس. يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه.
 Retrovir ViiV Healthcare الاسم العلمي: زيدوفويدين	قرص ٣٠٠ ملجرام مرتين يوميًا. ومتوفر في شكل شراب.	الأعراض الجانبية: انخفاض كرات الدم الحمراء (الأنيميا "فقر الدم")، انخفاض كرات الدم البيضاء، صداع، غثيان، ألم، تورم وتلف العضلات، شحوب لون الأظافر. كن حذرًا في تعاطي العقار مع الأنيميا (فقر الدم). يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه. يمكن تخفيف تقلصات المعدة إذا أخذ العقار مع تناول الطعام. تجنب تعاطي العقار مع عقار Zerit . يُستخدم أيضًا لمنع انتقال العدوى في الفترة أثناء الحمل وبعد الولادة (من الأم إلى الطفل).
 Videx EC بريستول مايرز سكويب الاسم العلمي: ديدانوسين	كبسولة مُغلقة ٤٠٠ ملجرام مرة واحدة يوميًا أو كبسولة ٢٥٠ ملجرام للمرضى الذين يقل وزنهم عن ١٣٢ رطل (٦٠ كيلوجرام). ويتوفر في شكل مسحوق.	الأعراض الجانبية: اعتلال الأعصاب الطرفية، الإحساس بوخز، تخدر أو ألم في اليدين والقدمين، تغيرات في شبيكة العينين، التهاب البنكرياس، غثيان، إسهال، صداع، قيء وجفاف الجلد. يجب تناول العقار سواء كان في شكل كبسولات أو مسحوق قبل الأكل بساعة على الأقل أو بعد الأكل بساعتين. تجنب استخدام الأقراص المضادة للحموضة مع الألومنيوم إذا تم تناول الكبسولات أو المسحوق، عندما يُقترن تناول العقار مع عقار Viread ، ينبغي خفض الجرعة إلى ٢٥٠ ملجرام يوميًا.
 Viread جلعاد سينسيز الاسم العلمي: تينوفوفير DF	قرص ٣٠٠ ملجرام مرة واحدة يوميًا.	الأعراض الجانبية: غثيان، قيء، إسهال، صداع وضعف العظام. يرجى فحص وظائف الكلى. يمكن أن يؤخذ مع أو تناول الطعام أو بدونه. عندما يُقترن تناول العقار مع عقار Videx ، ينبغي خفض جرعة Videx إلى ٢٥٠ ملجرام يوميًا.
 Zerit بريستول مايرز سكويب الاسم العلمي: ستافودين	كبسولة ٤٠ ملجرام مرتين يوميًا. أو (كبسولة ٣٠ ملجرام مرتين يوميًا للمرضى الذين يقل وزنهم عن ١٣٢ رطل (٦٠ كيلوجرام) أو أقل).	الأعراض الجانبية: اعتلال الأعصاب الطرفية، الإحساس بوخز، تخدر أو ألم في اليدين والقدمين، التهاب البنكرياس، أرق، صداع، غثيان وإسهال. تشير بعض الأدلة إلى أنه يجب ألا يؤخذ مع عقار الأزيدوثايميدين (AZT). يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه.
 Ziagen ViiV Healthcare الاسم العلمي: أبلكافير سولفات	كبسولة ٣٠٠ ملجرام مرتين يوميًا أو كبسولتين ٣٠٠ ملجرام مرة واحدة يوميًا. ومتوفر في شكل شراب.	الأعراض الجانبية: حساسية مُفرطة (تفاعلات تحسسية حادة)، غثيان، قيء، ضيق في التنفس، آلام في البطن، حمى و/أو طفح جلدي. المرضى الذين يعانون من تلك الآثار الجانبية في غضون ستة أسابيع بعد بدء العلاج بعقار Ziagen ربما يعانون من فرط الحساسية، وينبغي استشارة الطبيب الخاص بهم على الفور. كما يجب التوقف عن استخدام العقار بعد تشخيص أي تفاعل حساسية. وبمجرد التوقف عن تناول عقار Ziagen ، يجب ألا تتناول هذا العقار لأنه يمكن أن يكون قاتلاً. يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه.

مثبطات المنتسخة العكسية غير النوكليوزيدية (NNTIR)

 Edurant جانسن الاسم العلمي: ريليفيرين	قرص ٢٥ ملجرام مرة واحدة يوميًا.	الأعراض الجانبية: أرق، اكتئاب، ارتفاع في نتائج اختبارات وظائف الكبد، ارتفاع في نسبة الكرياتينين في الدم. يمكن أن يكون أقل قوة إذا كان الأساس HIV RNA < ١٠٠,٠٠٠ نسخة/ملييلتر . يتطلب بيئة حمضية في المعدة للامتصاص الجيد: يجب أن يؤخذ مع الطعام. ممنوع استخدامه مع مثبطات مضخة البروتون. يجب على المرضى الذين يتناولون عقار ريليفيرين تناول الأدوية المضادة للحموضة والمقللة لها (H2 blockers) في وقت معين.
 Intelence تبيوتيك الاسم العلمي: إترافيرين	قرصان ١٠٠ ملجرام مرتين يوميًا.	الأعراض الجانبية: تفاعلات جلدية حادة، متلازمة حالات ستيفينس جونسون، حساسية مُفرطة، يجب التوقف عن استخدام العقار في حالات الطفح الجلدي الحادة. يجب تناول العقار بعد الأكل. ينبغي ألا يعطى دواء Intelence مع مضادات الفيروسات القهقرية التالية: تيرنافير/ريتونافير، فوزام برينافير/ريتونافير، أتانازافير/ريتونافير، مثبطات البروتياز التي ليس لها ريترونافير ومثبطات للمنتسخة العكسية غير نوكليوزيدية (NNRTI).
 Rescriptor ViiV Healthcare الاسم العلمي: ديلافيردين ميزيلات	قرصان ٢٠٠ ملجرام ثلاث مرات يوميًا.	الأعراض الجانبية: طفح جلدي، صداع، إعياء، غثيان، ارتفاع في إنزيمات الكبد. يجب أخذ العقار قبل أو بعد تناول عقار Videx أو الأقراص المضادة للحموضة بساعة على الأقل. يرفع مستويات الدم لبعض مثبطات البروتياز. اتصل بطبيبك الخاص إذا كنت تعاني من الطفح الجلدي. يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه.

الأعراض الجانبية: الأعراض المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي (CNS): دوار، خمول، أرق، أحلام اليقظة، انخفاض التركيز، الشعور بعدم الاستقرار والطفح الجلدي. يجب تناول عقار Sustiva قبل النوم للحد من الأعراض الجانبية المحتملة. قد يتسبب في انخفاض مستويات الدم لبعض مثبطات البروتياز (PI) ويزيد أخرى. يقلل كل من الريفامبين والكلاريثروميسين من مستويات عقار Sustiva. تجنب استخدام الكحول وممارسة الأنشطة التي تتطلب التركيز. ينبغي للمرأة استخدام وسيلة منع الحمل بسبب خطر إلحاق الضرر بالجنين. تجنب الأغذية الدهنية. يفضل تناول العقار على معدة فارغة.	قرص ٦٠٠ ملليجرام مرة يوميًا أو ٣ كبسولات ٢٠٠ ملليجرام يوميًا.	Sustiva بريستول مايرز سكويب الاسم العلمي: إيفافيرنز (كما يباع أيضًا باسم Stocrin في بعض الدول)	
الأعراض الجانبية: طفح جلدي، اضطرابات بالمعدة، صداع، انخفاض كرات الدم البيضاء، زيادة إنزيمات الكبد. الجرعة المبدئية: قرص ٢٠٠ ملليجرام مرة واحدة يوميًا في أول ١٤ يومًا. انخفاض مستويات مثبطات البروتياز (PI). اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من طفح جلدي. يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه. ينبغي رصد إنزيمات الكبد، خاصة أثناء فترة الحمل. عندما يبدأ العلاج باستخدام عقار Viramune، كن حذرًا بعد الخلايا الثنائية T-cell. من غير المستحسن استخدام العقار للنساء اللاتي يرتفع لديهن عدد الخلايا إلى أعلى من ٢٥٠ خلية وللرجال الذين يرتفع لديهم عدد الخلايا إلى أعلى من ٤٠٠ خلية.	قرص ٢٠٠ ملليجرام مرة واحدة يوميًا لمدة ٤ يومًا ثم قرصين ٢٠٠ ملي مرتين يوميًا. ومتوفر في شكل شراب.	Viramune بوهرنجر انجلهائم الاسم العلمي: نيفيرابين	

مثبطات البروتياز (PI)

الأعراض الجانبية: غثيان، قيء، إسهال وطفح جلدي. يجب أن يؤخذ العقار مع تناول الطعام. يُستخدم بحذر من قبل المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد. غير موصى باستخدام العقار من قبل المرضى الذين يعانون من أعراض فشل الكبد الخفيف إلى الحاد. قد يسبب مُثبط أنيتفوث Aptivus نزيف داخل الجمجمة، فشل الكبد. اتصل فورًا بطبيبك الخاص إذا كنت تعاني من نزيف غير عادي أو نزيف بدون سبب. نزيف دون سبب واضح. يستخدم بحذر من قبل المرضى الذين يعانون من حساسية ضد عقاقير السلفا. يعمل العقار بشكل أفضل عندما يخلط بعقار Fuzeon. يجب تناول العقار مع الطعام فقط للمرضى الذين لديهم علاجات سابقة.	كبسولتان ٢٥٠ ملليجرام مع كبسولتين ١٠٠ ملليجرام Norvir مرتين يوميًا.	Aptivus بوهرنجر انجلهائم الاسم العلمي: تيبيرانافير	
الأعراض الجانبية: حصى الكلى (أعراض قد تكون ألم في الظهر أو الجنب)، ارتفاع في مستويات البيليروبين (صبغة بيلي)، طفح جلدي، جفاف الجلد، تساقط الشعر، غثيان وإسهال. ينبغي تناول العقار مع احتساء (من ٦ إلى ٨ أكواب من الماء يوميًا) لتجنب تكون حصى الكلى. يمكن تناول عقار Norvir مع الطعام أو بدونه. للعقار تفاعلات دوائية عدة، اتصل بطبيبك للاستعلام عنها. لا يُنصح بخلط العقار مع عقار أتانانافير.	كبسولتان ٢٥٠ ملليجرام مع كبسولتين ١٠٠ ملليجرام Norvir مرتين يوميًا.	Crixivan ميرك آند كميائي الاسم العلمي: أندينافير سولفات	
الأعراض الجانبية: غثيان، إسهال، انتفاخ البطن، آلام في البطن وصداع. ينبغي تناول العقار مع الطعام أو خلال ساعتين من تناول الطعام. ينبغي عدم تناول عقار Invirase مع عقار Norvir. انظر تفاعلات عقار Norvir.	قرصان ٥٠٠ ملليجرام مع كبسولة Norvir ١٠٠ ملليجرام مرتين يوميًا.	Invirase لا روش الاسم العلمي: ساكوينافير ميزيلات	
الأعراض الجانبية: ترسبات مائية، إسهال، غثيان، قيء، الشعور بالتعب أو الضعف. يحتوي هذا العقار على Norvir كما يشتمل على العديد من التفاعلات الدوائية. يُستخدم العقار بحذر من قبل المرضى المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بي أو سي. لا يوجد تقييدات متعلقة بالنظام الغذائي. الأقرص لا تحتاج إلى تبريد. يوصى فقط بتناول الجرعة مرة واحدة يوميًا للمرضى الذين ليس لهم علاجات سابقة. إذا كان النظام العلاجي يشتمل على عقار Sustiva أو عقار Viramune، فإنه ينبغي تعديل جرعة كاليتر. يوصى فقط بتناول الجرعة مرتين يوميًا للمرضى الذين لهم علاجات سابقة لم تكلل بالنجاح مع أدوية أخرى. إذا كان النظام العلاجي يشتمل على عقار Sustiva أو عقار Viramune، فإنه ينبغي تعديل جرعة كاليتر.	٤ أقراص مرة واحدة يوميًا (يوصى به لطالبي العلاج لأول مرة)، أو قرصين مرتين يوميًا.	Kaletra أبوت لابوراتوريز الاسم العلمي: ٢٠٠ ملليجرام لوبينافير + ٥٠ ملليجرام ريتونافير (كما يباع أيضًا باسم Aluvia في بعض الدول)	
الأعراض الجانبية: إسهال، غثيان، قيء، طفح جلدي، صداع، داء البول السكري، يمكن تناول العقار مع الطعام أو بدونه. الجرعة المركبة مع عقار Norvir للمرضى الذين يعانون من مثبطات البروتياز (PI) والجرعة الموصى بها هي مرتين يوميًا. يحتوي عقار Lexiva على مركبات مشتقة من السلفا.	قرصان ٧٠٠ ملليجرام مرتين يوميًا، أو قرص ٧٠٠ ملليجرام مع كبسولة من عقار Norvir مرتين يوميًا، أو قرصان ٧٠٠ ملليجرام مع كبسولة ١٠٠ ملليجرام من عقار Norvir مرة واحدة يوميًا. العقار متوفر في شكل شراب.	Lexiva ViiV Healthcare الاسم العلمي: فوساميرينافير كالسيوم (كما يباع باسم Telzir في بعض الدول)	
الأعراض الجانبية: غثيان، إسهال، آلام في البطن، ضعف، دوار، تخذر حول الفم، تغير في حاسة التذوق، ارتفاع في مستويات ثلاثيات الغليسريد والكوليسترول. ينبغي تناول العقار مع الطعام. يتفاعل عقار Norvir مع الأدوية الأخرى. قم بتقسيم جرعة عقار Videx في ما لا يقل عن ساعتين بين الجرعات. التبريد. إذا تعرض لدرجة حرارة الغرفة، يستخدم خلال ٣٠ يومًا.	٦ كبسولات ١٠٠ ملليجرام مرتين يوميًا. ومتوفر في شكل شراب. كما أنه معتمد لجرعات الأطفال (للأطفال من سن شهر إلى عامين).	Norvir أبوت لابوراتوريز الاسم العلمي: ريتونافير	
الأعراض الجانبية: غثيان، إسهال، صداع، التهاب في الحلق والأنف (أعراض مشابهة للبرد). وفي بعض الحالات، طفح جلدي ما بين المعتدل والحاد. يمكن أن يسبب العقار ارتفاعًا في الدهون وجلوكوز الدم (السكر). يُستخدم العقار بحذر مع المرضى المصابين بالهيموفيليا والمرضى الذين لديهم حساسية ضد عقاقير السلفا. يجب تناول العقار مع الطعام (بغض النظر عن كمية ونوعية الأطعمة). معتمد فقط للمرضى الذين تلقوا علاجات مضادة لمرض نقص المناعة البشرية (HIV). يمكن تخزين العقار في درجة حرارة الغرفة.	قرصان ٤٠٠ ملليجرام مع كبسولة ١٠٠ ملليجرام Norvir مرة واحدة يوميًا.	Prezista تيبوتيك الاسم العلمي: دارونافير	
الأعراض الجانبية: فرط بيليروبين الدم (يزول هذا العرض بعد التوقف عن تناول العقار)، تغير في معدل ضربات القلب، ارتفاع السكر، غثيان، قيء، إسهال، حُمى، صداع، وخز وتتمل في اليدين والقدمين، آلام المفاصل، حصوات الكلى. ينبغي تناول العقار مع الطعام. ويختلف عقار Reyataz عن غيره من مثبطات البروتياز (PI) حيث إنه لا يغير نسبة الدهون في الدم. عند تناول العقار مع عقار Sustiva أو Viread، أضف Norvir إلى نظام Reyataz. في هذا المزيج، ينبغي خفض Reyataz إلى ٣٠٠ مجم يوميًا (Reyataz ٣٠٠ مجم/ Norvir ١٠٠ مجم). لا تمزج Reyataz مع Crixivan. يؤخذ بعد ساعتين من تناول مُضادات الحموضة، و ١٠ ساعات بعد مُضادات H2 ولا يتناول مع مثبطات مضخة البروتون.	كبسولتان ٢٠٠ ملليجرام مرة واحدة يوميًا أو كبسولة ٣٠٠ ملليجرام زائد كبسولة Norvir مرة واحدة يوميًا للمرضى الذين لهم علاجات سابقة.	Reyataz بريستول مايرز سكويب الاسم العلمي: أتانانافير	
الأعراض الجانبية: إسهال، غثيان، طفح جلدي، صداع، تقلصات في المعدة. ينبغي تناول العقار مع الطعام لتحسين الامتصاص. للعقار تفاعلات دوائية معينة. تحذير: حتى إشعار آخر، لا يُنصح باستخدامه من قبل الأطفال الذين بدأوا العلاج أو النساء الحوامل وذلك بسبب شوائب الأقرص.	قرصان ٦٢٥ ملليجرام أو ٥ أقراص ٢٥٠ ملليجرام مرتين يوميًا. ومتوفر في شكل مسحوق.	Viracept ViiV Healthcare الاسم العلمي: نيلفينافير	

مُثبِّطات الالتحام

	Fuzeon روش أند تريميري الاسم العلمي: إنفوفيرتيد	حقنة تحت الجلد ٩٠ ملليجرام كل ١٢ ساعة.	تفاعل الحساسية في مكان الحقن: حكة، تورم، احمرار، ألم، وتصلب الجلد (عمومًا، تظهر هذه التفاعلات مرة أخرى مكان الحقن في المرة القادمة). تفاعل الحساسية المُعَمَّم: ضيق في التنفس، حمى، قيء، بول دموي، تورم القدمين، التهاب رئوي، إمساك، التهاب البنكرياس، ألم في العضلات وفقدان الشهية. وقد لوحظت هذه الآثار مُجمَّعة مع غيرها من مضادات الفيروسات القهقرية. لا قيود غذائية. يمكن تخزين Fuzeon® وفوارير الماء المُعَمَّم في درجة حرارة الغرفة، من ٥٩ درجة فهرنهايت إلى ٨٦ فهرنهايت (١٥ درجة مئوية - ٣٠ درجة مئوية). إذا كانت درجة حرارة الغرفة أعلى، فإن أفضل تطبيق هو تخزين Fuzeon® في الثلاجة. بمجرد مزج العقار بالماء المُعَمَّم، يمكن تخزينه في الثلاجة لمدة ٢٤ ساعة. يعتبر عقار Fuzeon® معتمد للاستخدام من قِبل المرضى الذين لديهم تجربة مع علاج مُضادات الفيروسات.
	Selzentry ViiV Healthcare الاسم العلمي: مارافيروك (كما يباع أيضًا باسم Celsentri في بعض الدول)	قرص ١٥٠ ملليجرام مرتين يوميًا، أو قرص ٣٠٠ ملليجرام مرتين يوميًا أو قرصين ٣٠٠ ملليجرام مرتين يوميًا (الجرعة الموصوفة تعتمد على تركيبها مع عقاقير أخرى).	الأعراض الجانبية: سُعال، حمى، طفح جلدي، آلام العضلات والمفاصل، آلام المعدة والدوار. الأعراض الأقل تكرارًا: مشاكل الكبد، نوبات قلبية، انخفاض الضغط الوضعي، مخاطر مُحتملة للالتهابات أو الأمراض السرطانية. يُمكن تناوله مع الطعام أو بدونه. يُمزج مع مُضادات الفيروسات الأخرى. يُستحسن استخدامه من قِبل المرضى البالغين الذين عانوا من تجارب علاجية غير ناجحة مع فيروس نقص المناعة البشرية HIV-1 المُكتشف الاستوائي CCR5 والمقاومة لمضادات الفيروسات القهقرية المتعددة. قم بإجراء اختبار تفاعل الأجسام مع المؤثرات الخارجية قبل استخدام Selzentry لتحديد المُستقبلات الخلوية (CCR5 أو CXCR4).

مُثبِّطات الدمج

	Isentress ميرك أند كيمباتي الاسم العلمي: رالتيجرافير	قرص ٤٠٠ ملليجرام مرتين يوميًا.	الأعراض الجانبية: إسهال، غثيان، صداع. الأعراض الأقل تكرارًا: ارتفاع كيناز الكرياتين (CK)، فضلًا عن اعتلال العضلات وانحلال الرُّبيدات (تدمير العضلات). يمكن تناول العقار مع أو بدون طعام. يؤخذ مع مضادات الفيروسات الأخرى. يُستحسن استخدام العقار من قِبل المرضى البالغين الذين عانوا في وقت مُسبق من تجارب علاجية غير ناجحة مع السلالات المقاومة لمرض نقص المناعة البشرية HIV-1 لمضادات الفيروسات القهقرية المتعددة. يُستخدم العقار بحذر عندما يُعطى مع مُحرضات الإنزيمات UGT (مثل ريفامبين) لأن مستويات رالتيجرافير تكون منخفضة.
---	---	--------------------------------	---

التركيبات

	Atripla بريستول مايرز سكويب، جلعاد سينسيز (مزيج من إيفافيرانز ٦٠٠ ملليجرام + إيمتريسيتابين ٢٠٠ ملليجرام + تينوفوفير DF 300 ملليجرام، I NNRTI + I NRTI)	قرص واحد يوميًا.	الأعراض الجانبية: للحصول على معلومات حول الآثار السلبية، يرجى الاطلاع على عقار Sustiva® (إيفافيرانز)، وعقار Emtriva® (إيمتريسيتابين) وعقار Viread® (تينوفوفير DF). ينبغي تناول العقار بدون طعام وقبل النوم وذلك للحد من تطور الآثار الجانبية المحتملة. يخزن في درجة حرارة الغرفة.
	Combivir ViiV Healthcare (مزيج من لاميفودين ١٥٠ ملليجرام + زيدوفودين ٣٠٠ ملليجرام، 2 NRTI)	قرص مرتين يوميًا.	لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، يُرجى الاطلاع على عقار Retrovir® (AZT) وEpivir® (3TC). كن حذرًا في تناول العقار في حالات فقر الدم. التركيبات التي سبق ذكرها بالفعل ينبغي ألا توصف للمرضى الذين بحاجة لأي تعديلات في الجرعة. يمكن تناول العقار مع الطعام أو بدونه. تقل تقلصات المعدة إذا تم تناول العقار مع الطعام.
	Complera جلعاد سينسيز، جانسن ثيرابيوتيكس (يحتوي على ٢٥ ملليجرام ريليفيرين + ٣٠٠ ملليجرام تينوفوفير DF 300 + و ٢٠٠ ملليجرام إيمتريسيتابين، I NNRTI و 2 NRTI)	قرص مرة واحدة يوميًا.	الأعراض الجانبية الأكثر حدوثًا: اضطرابات في النوم، أحلام غريبة، صداع، دوار، إسهال، غثيان، طفح جلدي، إعياء، اكتئاب، قيء وآلام في البطن. الأعراض الجانبية الأقل حدوثًا: مشاكل في الكلى، مشاكل في العظام (منها آلام العظام، لين العظام الذي يمكن أن يؤدي إلى الكسور)، تغيرات في نسبة الدهون في الجسم. يرجى الاطلاع على قسم "ماذا عن الأعراض الجانبية؟" لكل من عقار Edurante وعقار Viread وعقار Emtriva للتعرف على مزيد من الأعراض الجانبية المحتملة. يعتبر عقار Complera معتمد فقط للاستخدام من قِبل المرضى الذين يعانون من مرض نقص المناعة البشرية (HIV) ويبدأون علاج هذا المرض لأول مرة. يجب عدم تناول العقاقير الأخرى التي تحتوي على إيمتريسيتابين أو لاميفودين في حالة تناول عقار Complera.
	Epzicom ViiV Healthcare (مزيج من عقار أباكافير ٦٠٠ ملليجرام + لاميفودين ٣٠٠ ملليجرام، 2 NRTI) (كما يباع أيضًا باسم Kivexa في بعض الدول)	قرص واحد يوميًا.	لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، يُرجى الاطلاع على عقار Ziagen® وعقار Epivir®. يمكن تناول العقار مع الطعام أو بدونه. يحتوي هذا العقار على Ziagen® (أباكافير) ويمكن أن يسبب حساسية خطيرة (يرجى قراءة توصيات استخدام عقار Ziagen®).
	Trizivir ViiV Healthcare (مزيج من عقار زيدوفودين ٣٠٠ ملليجرام + لاميفودين ١٥٠ ملليجرام + أباكافير ٣٠٠ ملليجرام، 3 NRTI)	قرص واحد مرتين يوميًا.	لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، يُرجى الاطلاع على عقار Retrovir® (AZT) وEpivir® (3TC) وعقار Ziagen® (أباكافير). يحتوي هذا العقار على Ziagen® (أباكافير) ويمكن أن يسبب حساسية خطيرة (يرجى قراءة توصيات استخدام عقار Ziagen®). يمكن أن يؤخذ مع الطعام أو بدونه.
	Truvada جلعاد سينسيز (مزيج من تينوفوفير DF 300 ملليجرام + إيمتريسيتابين ٢٠٠ ملليجرام، 2 NRTI)	قرص واحد يوميًا.	لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، يُرجى الاطلاع على عقار Viread® وعقار Emtriva®. يمكن تناول العقار مع الطعام أو بدونه.