

Ce tableau de médicaments comporte tous les antirétroviraux approuvés pour le traitement du VIH. Le tableau donne le nom du médicament, le dosage prescrit et des informations importantes sur les effets non souhaités (le médicament n'est pas représenté en grandeur nature). Pour plus de détails, consulter la notice de chacun des médicaments. Par Sense, une publication électronique du MSMGF. www.msmgf.org

Tableau des médicaments contre le VIH

Analogues nucléosidiques/nucléotidiques inhibiteurs de la transcriptase inverse (INTR)

	Médicament	Doses	Effets non souhaités et autres informations importantes
	Emtriva Gilead Sciences Générique : emtricitabine	1 gélule de 200 mg une fois par jour. Disponible sous forme liquide.	Effets secondaires : Céphalées, diarrhées, nausées, rougeurs et décoloration de la peau légère à modérée. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas. L'Emtriva® est très semblable à l'Épivir®. Les patients résistants à l'Épivir® le seront probablement également à l'Emtriva®.
	Epivir ViiV Healthcare Générique : lamivudine	1 comprimé de 300 mg une fois par jour ou 1 comprimé de 150 mg deux fois par jour. Disponible sous forme liquide.	Effets secondaires : Céphalées, fatigues, nausées, diarrhées, insomnies, faible taux de globules blancs (neutropénie) et de globules rouges (anémie), pancréatite, chute des cheveux (alopécie). Susceptible, en combinaison avec la zidovudine, «d'inverser» la résistance du VIH à l'AZT. Éviter la consommation d'alcool. Contrôler les triglycérides, tout particulièrement chez les enfants, étant donné les risques de pancréatite. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas.
	Retrovir ViiV Healthcare Générique : zidovudine	1 comprimé de 300 mg deux fois par jour. Disponible sous forme liquide.	Effets secondaires : Faible taux de globules rouges (anémie), neutropénie, céphalées, nausées, douleurs et inflammations musculaires (myalgies), décoloration des ongles. Symptômes d'anémie à surveiller. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas. Les problèmes digestifs sont atténués si le médicament est ingéré pendant les repas. Évitez de le consommer avec du Zerit®. Peut également être utilisé pour prévenir la transmission périnatale (de mère à enfant).
	Videx EC Bristol-Myers Squibb Générique : didanosine	1 comprimé pelliculé de 400 mg une fois par jour ou 1 comprimé de 250 mg pour toute personne de moins de 60 kg (132 livres). Disponible en poudre.	Effets secondaires : Neuropathie périphérique, fourmillement, engourdissement ou douleurs dans les mains et dans les pieds, anomalies rétinienne, pancréatite, nausées, diarrhées, céphalées, vomissements, xérodémie. Les deux préparations doivent être prises au moins une heure avant le repas ou deux heures après le repas. Éviter la consommation de comprimés antiacides contenant de l'aluminium si vous prenez la préparation en comprimés ou en poudre. Réduire la dose de 250 mg par jour si le médicament est utilisé en association avec du Viread®.
	Viread Gilead Sciences Générique : tenofovir DF	1 comprimé de 300 mg une fois par jour.	Effets secondaires : Nausées, vomissements, diarrhées, céphalées et ostéopénie. Contrôler la fonction des reins. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas. Réduire la dose à 250 mg par jour si le médicament est utilisé en association avec du Videx®.
	Zerit Bristol-Myers Squibb Générique : stavudine	1 gélule de 40 mg deux fois par jour. Pour les personnes de moins de 60 kg (132 livres) : 1 gélule de 30 mg deux fois par jour.	Effets secondaires : Neuropathie périphérique, fourmillement, engourdissement ou douleurs dans les mains et dans les pieds, pancréatite, insomnies, céphalées, nausées et diarrhées. Le d4T ne doit pas être utilisé de façon concomitante avec l'AZT. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas.
	Ziagen ViiV Healthcare Générique : sulfate d'abacavir	1 comprimé de 300 mg deux fois par jour ou 2 comprimés de 300 mg une fois par jour. Disponible sous forme liquide.	Effets secondaires : Réaction d'hypersensibilité (réaction allergique sévère), nausées, vomissements, difficulté à respirer, douleurs abdominales, fièvres et/ou éruptions cutanées. Les personnes présentant ces effets secondaires dans les six semaines après avoir commencé leur traitement au Ziagen® peuvent en réalité souffrir d'une réaction d'hypersensibilité et doivent immédiatement contacter leur médecin traitant. Le traitement doit être poursuivi jusqu'à ce que le diagnostic de réaction allergique soit posé. Une fois le traitement par Ziagen® interrompu, la reprise du traitement n'est pas envisageable, au risque d'entraîner une évolution fatale. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas.

Analogues non nucléosidiques inhibiteurs de la transcriptase inverse (INNTR)

	Edurant Janssen Therapeutics Générique : Rilpivirine	1 comprimé de 25 mg une fois par jour.	Effets secondaires : Insomnie, dépression, élévation du taux d'enzymes hépatiques, élévation du taux de créatinine sérique. Efficacité pouvant être amoindrie chez les patients ayant un taux initial d'ARN du VIH > 100 000 copies/ml. Nécessite un environnement gastrique acide pour faciliter l'absorption : à ingérer pendant les repas. Contre-indiqué avec les inhibiteurs de la pompe à protons. La prise d'autres comprimés antiacides et d'antagonistes des récepteurs H2 doit être effectuée à un moment précis en cas d'utilisation par les patients traités par rilpivirine.
	Intelence Janssen Therapeutics Générique : étravirine	2 comprimés de 100 mg deux fois par jour.	Effets secondaires : Réactions cutanées sévères, cas de syndrome de Stevens-Johnson, réactions d'hypersensibilité. Interrompre le traitement en cas d'éruption cutanée sévère. Doit être ingéré après le repas. L'Intelence ne doit pas être prescrit de façon concomitante avec les antirétroviraux suivants : Tipranavir/ritonavir, fosamprenavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir ; inhibiteurs de la protéase ne contenant pas de ritonavir et les INNTR.
	Rescriptor ViiV Healthcare Générique : delavirdine mesylate	2 comprimés de 200 mg trois fois par jour.	Effets secondaires : Éruption cutanée, céphalées, fatigues, nausées, élévation des taux d'enzymes hépatiques. Doit être pris au moins une heure avant ou après avoir pris du Videx® ou des comprimés antiacides. Augmentation des taux sanguins de certains inhibiteurs de la protéase. Contactez votre médecin traitant en cas d'éruption cutanée. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas.

	Sustiva Bristol-Myers Squibb (Aussi vendu sous le nom de Stocrin dans certains pays) Générique : efavirenz	1 gélule de 600 mg une fois par jour ou 3 gélules de 200 mg une fois par jour.	Effets secondaires : Symptômes liés au système nerveux central (SNC) : vertiges, somnolences, insomnies, confusion mentale, détérioration de la concentration, sensation d'instabilité et éruption cutanée. Prendre le Sustiva® avant de se coucher permet de minimiser les éventuels effets secondaires. Peut réduire les taux sanguins de certains inhibiteurs de la protéase et en augmenter d'autres. La rifampine et la clarithromycine réduisent la concentration de Sustiva®. Éviter la consommation d'alcool et les activités exigeant de la concentration. Les femmes devront faire un test de grossesse étant donné le risque encouru par le fœtus. Éviter les aliments gras et riches en lipides. À ingérer de préférence l'estomac vide.
	Viramune Boehringer-Ingelheim Générique : névirapine	1 comprimé de 200 mg deux fois par jour. Disponible sous forme liquide.	Effets secondaires : Éruption cutanée, problèmes de digestion, céphalées, neutropénie, augmentation du taux d'enzymes hépatiques. Dose de début de traitement : 1 comprimé de 200 mg une fois par jour durant les 14 premiers jours. Réduction des taux d'IP. Contactez votre médecin traitant en cas d'éruption cutanée. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas. Les enzymes hépatiques doivent être contrôlées, tout particulièrement durant la grossesse. Au début du traitement par Viramune®, réaliser un dénombrement des lymphocytes T. Le traitement n'est pas indiqué chez les femmes présentant un taux de lymphocytes supérieur à 250/mm ³ et chez les hommes présentant un taux de lymphocytes supérieur à 400/mm ³ .

Inhibiteurs de la protéase (IP)

	Aptivus Boehringer-Ingelheim Générique : tipranavir	2 gélules de 250 mg avec 2 gélules de 100 mg de Norvir® deux fois par jour.	Effets secondaires : Nausées, vomissements, diarrhées, éruptions cutanées. À ingérer pendant les repas. Précaution chez les patients souffrant d'hépatite. Contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique modérée à sévère. L' Aptivus peut générer une hémorragie intracrânienne. Insuffisance hépatique. Consultez immédiatement votre médecin traitant en cas de saignement inhabituel ou sans cause apparente. Précaution chez les personnes allergiques aux sulfamidés. Plus efficace en association avec le Fuzeon®. À usage exclusif de patients prétraités par des antirétroviraux. À ingérer pendant les repas.
	Crixivan Merck & Co. Générique : sulfate d'indinavir	2 gélules de 400 mg avec 1 ou 2 gélules de Norvir® deux fois par jour.	Effets secondaires : Calculs rénaux (peuvent prendre la forme d'un mal de dos ou d'une douleur au flanc), augmentation du taux de bilirubine (pigment biliaire), éruptions cutanées, xérodermie, alopecie, nausées et diarrhées. À ingérer avec de l'eau (6 à 8 verres d'eau par jour) pour éviter les calculs rénaux. Avec le Norvir®, peut être ingéré pendant ou en dehors des repas. Présente diverses interactions médicamenteuses, consultez votre médecin traitant. Il n'est pas conseillé de le combiner avec de l'atazanavir.
	Invirase La Roche Générique : mésylate de	2 gélules de 500 mg avec 1 gélule de 100 mg de Norvir® deux fois par jour.	Effets secondaires : Nausées, diarrhées, flatulences, douleurs abdominales, céphalées. À ingérer pendant les repas ou dans les deux heures suivant un repas. L'Invirase® ne peut être utilisé sans Norvir®. Veuillez consulter les interactions du Norvir®.
	Kaletra Laboratorios Abbott Générique : 200 mg de lopinavir + 50 mg de ritonavir (Aussi vendu sous le nom de Aluvia dans certains pays)	4 comprimés une fois par jour ou 2 comprimés deux fois par jour.	Effets secondaires : Selles blanches, diarrhée, nausées, vomissements, sensation de fatigue ou de faiblesse. Ce médicament contient du Norvir® et présente de nombreuses interactions médicamenteuses. Précautions chez les patients co-infectés par les virus des hépatites B ou C. Aucune restriction alimentaire. Les comprimés ne doivent pas être réfrigérés. Une seule prise quotidienne n'est recommandée qu'aux patients non prétraités par des antirétroviraux. Si le régime contient du Sustiva® ou du Viramune®, la dose de Kaletra doit être ajustée. Deux prises quotidiennes ne sont recommandées qu'aux patients prétraités par des antirétroviraux chez qui d'autres médicaments n'ont pas fonctionné. Si le régime contient du Sustiva® ou du Viramune®, la dose de Kaletra doit être ajustée.
	Lexiva ViiV Healthcare Générique : fosamprenavir (Aussi vendu sous le nom de Telzir dans certains pays)	2 comprimés de 700 mg deux fois par jour ; ou 1 comprimé de 700 mg avec une gélule de Norvir® de 100 mg deux fois par jour ; ou 2 comprimés de 700 mg avec une gélule de Norvir® de 100 mg une fois par jour.	Effets secondaires : Diarrhées, nausées, vomissements, éruptions cutanées, céphalées et diabète. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas. La prise de ce médicament associée à du Norvir® est réservée aux patients prétraités par un inhibiteur de la protéase, deux prises par jour sont alors recommandées. Lexiva® contient des composés dérivés des sulfamidés.
	Norvir Laboratorios Abbott Générique : ritonavir	6 gélules de gélatine molle de 100 mg deux fois par jour. Disponible sous forme liquide. Existe aussi en doses pédiatriques (de 1 mois à 2 ans d'âge).	Effets secondaires : Nausées, diarrhées, douleurs abdominales, faiblesse, vertiges, engourdissement autour de la bouche, modifications de la perception du goût, augmentation des taux de triglycérides et de cholestérol. À ingérer pendant les repas. Le Norvir® présente des interactions avec d'autres médicaments. Les prises de Vindex® doivent être distantes d'au moins deux heures. Réfrigération. En cas d'exposition à la température ambiante, consommer dans les 30 jours.
	Prezista Janssen Therapeutics Générique : darunavir, TMC 114	2 comprimés de 300 mg avec 1 gélule de Norvir® de 100 mg deux fois par jour.	Effets secondaires : Nausées, diarrhées, céphalées, inflammation de la gorge et du nez (symptômes similaires à ceux d'un rhume). Dans certains cas, éruptions cutanées de modérées à sévères. Peut causer des augmentations de lipides et de glucose (sucre) dans le sang. Des précautions particulières doivent être adoptées pour les patients hémophiles ou allergiques aux sulfamidés. À ingérer pendant les repas (peu importe la quantité ou la qualité des aliments). Uniquement approuvé pour des patients prétraités par des antirétroviraux. Peut être conservé à température ambiante.
	Reyataz Bristol-Myers Squibb Générique : sulfate d'atazanavir	2 gélules de 200 mg une fois par jour. 1 gélule de 300 mg plus une gélule de Norvir® une fois par jour chez des patients prétraités.	Effets secondaires : Hyperbilirubinémie (réversible après l'arrêt du traitement), modifications du rythme cardiaque, hyperglycémie, nausées, vomissements, diarrhées, fièvres, céphalées, engourdissements et sensation de fourmillement dans les mains et les pieds, douleurs articulaires, calculs rénaux. À ingérer pendant les repas. À la différence d'autre IP, Reyataz® ne modifie pas le taux de lipides dans le sang. Lorsqu'il est utilisé en association avec du Sustiva® ou du Viread®, ajouter du Norvir® au régime de Reyataz®. Dans ce cas, la dose de Reyataz® doit être réduite à 300 mg par jour (Reyataz® 300 mg/Norvir® 100 mg). Ne pas combiner le Reyataz® avec du Crixivan®. À ingérer 2 heures avant ou après des antiacides, 10 heures après les antagonistes H2 et ne pas consommer avec les inhibiteurs de la pompe à protons.
	Viracept ViiV Healthcare Générique : nelfinavir	2 comprimés de 625 mg ou 5 comprimés de 250 mg deux fois par jour. Disponible en poudre.	Effets secondaires : Diarrhées, nausées, éruptions cutanées, céphalées et crampes d'estomac. À ingérer pendant les repas pour en faciliter l'absorption. Présente certaines interactions médicamenteuses. Avertissement : jusqu'à nouvel ordre, étant donné les impuretés présentes dans le comprimé, le médicament n'est pas conseillé aux enfants qui entament un traitement anti-VIH ni aux femmes enceintes.

Inhibiteur du fusion, inhibiteur d'entre

	Fuzeon Roche y Trimeris, Inc. Générique : enfuvirtide	1 injection (1ml/cc) sous-cutanée toutes les 12 heures.	Réaction allergique autour du point d'injection : Picotement, gonflement, rougeur, douleur, dureté (généralement, la réaction se répète autour du point d'injection suivant). Réaction allergique généralisée : problèmes de respiration, fièvres, vomissements, sang dans les urines, gonflement des pieds, pneumonie, constipation, pancréatite, douleurs musculaires, diminution de l'appétit, en cas d'association avec d'autres antirétroviraux. Aucune restriction alimentaire. Les ampoules de Fuzeon® et d'eau stérilisée peuvent être conservées à température ambiante, entre 15° et 30°C (59° et 86°F). Si la température ambiante est supérieure, il est recommandé de conservé le Fuzeon® au réfrigérateur, une fois mélangé à l'eau stérilisée, il peut être conservé au frais pendant 24 heures. Le Fuzeon® n'est approuvé que pour des patients prétraités par des antirétroviraux.
	Selzentry ViiV Healthcare Générique : maraviroc (Aussi vendu sous le nom de Censenti dans certains pays)	1 comprimé de 150 mg deux fois par jour ou 1 comprimé de 300 mg deux fois par jour ou 2 comprimés de 300 mg deux fois par jour (la dose prescrite dépendra de son association avec d'autres médicaments).	Effets secondaires : Toux, fièvres, refroidissements, éruptions cutanées, douleurs musculaires et articulaires, douleurs de l'estomac et vertiges. Plus rarement : problèmes hépatiques, infarctus du myocarde, hypotension orthostatique, risque théorique de développement d'infections ou de cancers. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas. À combiner avec d'autres antirétroviraux. Approuvé pour des patients adultes prétraités par des antirétroviraux chez qui d'autres traitements ont échoué et ayant un VIH-1 à tropisme CCR5 détectable et résistant à de multiples antirétroviraux. Réaliser une analyse du tropisme avant d'utiliser le Selzentry pour déterminer le récepteur cellulaire (CCR5 ou CXCR4).

Inhibiteur de l'intégrase

	Isentress Merck & CO. Inc. Générique : raltegravir	1 comprimé de 400 mg deux fois par jour.	Effets secondaires : Diarrhées, nausées, céphalées. Plus rarement : élévation de la créatine kinase (CK), avec myopathie et rhabdomyolyse (destruction musculaire). Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas. À combiner avec d'autres antirétroviraux. Approuvé pour des patients adultes prétraités par des antirétroviraux chez qui d'autres traitements ont échoué et ayant des souches de VIH-1 résistantes à de multiples antirétroviraux. Il convient d'adopter des précautions particulières en cas d'administration combinée avec des inducteurs de l'enzyme UGT (ex : rifampine), car les taux de raltégravir diminuent.
---	---	--	---

Combinaisons

	Atripla Bristol-Myers Squibb et Gilead Sciences Combinaison de 600 mg d'éfavirenz + 200 mg d'emtricitabine + 300 mg de ténofovir DF Deux classes de médicaments (1 INNTI + 2 INTI).	1 comprimé une fois par jour.	Effets secondaires : Pour de plus amples informations sur les effets secondaires, veuillez vous référer au Sustiva® (éfavirenz), à l'Emtriva® (emtricitabine) et au Viread® (tenofovir DF). À ingérer sans nourriture avant de se coucher pour minimiser l'apparition d'éventuels effets secondaires. Conserver à température ambiante.
	Combivir ViiV Healthcare Combinaison de 150 mg de lamivudine + 300 mg de zidovudine. (2 INTR)	1 comprimé deux fois par jour.	Pour de plus amples informations sur les effets secondaires, veuillez vous référer au Retrovir® (AZT) et à l'Épivir® (3TC). Symptômes d'anémie à surveiller. Les combinaisons établies ne doivent pas être prescrites à des patients nécessitant des ajustements de dose. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas. Les problèmes digestifs sont atténués si le médicament est ingéré pendant les repas.
	Complera Gilead Sciences et Janssen Therapeutics Combinaison de 25 mg de rilpivirine + 300 mg de ténofovir DF + 200 mg d'emtricitabine ; 1 INNTI et 2 INTI	1 comprimé une fois par jour.	Effets secondaires les plus fréquents : troubles du sommeil, rêves anormaux, céphalées, vertiges, diarrhées, nausées, rougeurs, fatigue, dépression, vomissements et crampes d'estomac. Plus rarement : problèmes rénaux, problèmes osseux (douleurs osseuses, ramollissement et amincissement des os pouvant entraîner des fractures), modification de la masse grasseuse. Voir rubrique « Effets secondaires » de l'Edurant, du Viread et de l'Emtriva pour en savoir plus sur les effets secondaires possibles. Médicament approuvé uniquement pour les patients vivant avec le VIH qui débutent un traitement pour la première fois. Ne pas associer à d'autres médicaments contenant de l'emtricitabine ou de la lamivudine.
	Epzicom ViiV Healthcare Combinaison de 600 mg d'abacavir + 300 mg de lamivudine (2 INTI) (Aussi vendu sous le nom de Kivexa dans certains pays)	1 comprimé une fois par jour.	Pour de plus amples informations sur les effets secondaires, veuillez vous référer au Ziagen® et à l'Épivir®. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas. Ce médicament contient du Ziagen® (abacavir) et peut causer une série de réactions allergiques (voir les recommandations pour le Ziagen®).
	Trizivir ViiV Healthcare combinaison de zidovudine 300 mg + lamivudine 150 mg + abacavir 300 mg. Également connu sous le nom TZV (3 INTI)	1 comprimé deux fois par jour.	Pour de plus amples informations sur les effets secondaires, veuillez vous référer au Retrovir® (AZT) et à l'Épivir® (3TC) et au Ziagen® (abacavir). Ce médicament contient du Ziagen® (abacavir) et peut causer une série de réactions allergiques (voir les recommandations pour le Ziagen®). Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas.
	Truvada Gilead Sciences Combinaison de 300 mg de ténofovir DF + 200 mg d'emtricitabine (2 INTI)	1 comprimé une fois par jour.	Pour de plus amples informations sur les effets secondaires, veuillez vous référer au Viread® et à l'Emtriva®. Peut être ingéré pendant ou en dehors des repas.