

Este mapa contém todos os medicamentos antirretrovirais aprovados para o tratamento do HIV, constando o nome dos medicamentos, as dosagens, e informações importantes sobre os efeitos colaterais (as imagens não mostram o tamanho real do medicamento). Para informações completas, consulte a bula e as orientações dadas na hora da dispensação de cada medicamento. Informações da Sense, uma publicação on-line do MSMGF: www.msngf.org

Mapa de medicamentos para o tratamento do HIV

Análogos nucleosídeos/nucleotídeos inibidores da transcriptase reversa (NRTI)

	Medicamento	Dosagem	Efeitos colaterais e outras informações importantes
	Emtriva Gilead Sciences Genérico: emtricitabine	1 Pílula de 200 mg uma vez ao dia. Disponível em gotas.	Efeitos colaterais: Dor de cabeça, diarreia, náuseas, vermelhidão e descoloração da pele de leve a moderada. Pode ser ingerido de estômago vazio. Emtriva® é muito similar a Epivir®. Pacientes que são resistentes a Epivir®, provavelmente também são à Emtriva®.
	Epivir ViiV Healthcare Genérico: lamivudine	1 Pílula de 300 mg uma vez ao dia, ou 1 Pílula de 150 mg duas vezes ao dia. Disponível em gotas.	Efeitos colaterais: Dor de cabeça, fadiga, náuseas, diarreia, insônia, baixa contagem de leucócitos (neutropenia), e hemáceas (anemia), pancreatite, queda de cabelo. Pode "reverter" a resistência do HIV ao AZT se usados em conjunto. Evite consumo de álcool. Controlar triglicerídeos especialmente em crianças por risco de pancreatite. Pode ser ingerido de estômago vazio.
	Retrovir ViiV Healthcare Genérico: zidovudine	1 Pílula de 300 mg duas vezes ao dia. Disponível em gotas.	Efeitos colaterais: Baixa contagem de hemáceas (anemia), neutropenia, dor de cabeça, náuseas, dor, inflamação e dano muscular; descoloração das unhas. Cuidado com a anemia. Pode ser ingerido de estômago vazio. Ao ingeri-lo com alimentos as moléstias estomacais podem ser reduzidas. Evite tomá-lo com Zerit®. Também utilizado para prevenir a transmissão perinatal (materno-fetal).
	Videx EC Bristol-Myers Squibb Genérico: didanosine	1 Pílula revestida de 400 mg uma vez ao dia, ou 1 Pílula de 250 mg quando o peso for inferior a 132 libras (60 kg). Fórmula disponível em pó.	Efeitos colaterais: Neuropatia periférica, formigamento, adormecimento ou dor nas mãos e nos pés, mudanças na retina, pancreatite, náuseas, diarreia, dor de cabeça, vômitos, secura da pele. Ambas as fórmulas devem ser tomadas com pelo menos uma hora antes da ingestão de alimentos ou duas horas após. Evite o uso de antiácidos que contenham alumínio se estiver tomando as fórmulas em Pílulas ou pó. Quando combinado com Viread®, deve-se reduzir a dose a 250 mg ao dia.
	Viread Gilead Sciences Genérico: tenofovir DF	1 Pílula de 300 mg uma vez ao dia.	Efeitos colaterais: Náuseas, vômitos, diarreia, dor de cabeça e osteopenia. Controlar a função dos rins. Pode ser ingerido de estômago vazio. Se combinado com Videx®, reduzir a dose de Videx® a 250 mg ao dia.
	Zerit Bristol-Myers Squibb Genérico: stavudine	1 Pílula de 40 mg duas vezes ao dia. Peso 132 libras (60 kg) ou menos, 1 Pílula de 30 mg duas vezes ao dia.	Efeitos colaterais: Neuropatia periférica, formigamento, adormecimento ou dor nas mãos e pés, pancreatite, insônia, dor de cabeça, náuseas e diarreia. Certa evidência sugere que não deve ser tomado juntamente com o AZT. Pode ser ingerido de estômago vazio.
	Ziagen ViiV Healthcare Genérico: abacavir sulfate	1 Pílula de 300 mg duas vezes ao dia, ou 2 pílulas Pílulas de 300 mg uma vez ao dia. Disponível em fórmula líquida.	Efeitos colaterais: Reação de hipersensibilidade (reação alérgica séria), náuseas, vômitos, dificuldade para respirar, dor abdominal, febre e/ou erupções cutâneas. As pessoas que padecem destes efeitos colaterais dentro das seis semanas após o início do uso de Ziagen®, podem sofrer de uma reação de hipersensibilidade e devem contatar seu médico imediatamente. Perante o diagnóstico de reação alérgica, deve-se descontinuar a medicação. Uma vez que se descontinue o uso do Ziagen®, não se deve voltar a tomar este medicamento, já que pode ser fatal. Pode ser ingerido com o sem comida.

Análogos não-nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa (INNT)

	Edurant Janssen Therapeutics Genérico: Rilpivirine	1 Pílula de 25 mg, uma vez ao dia.	Efeitos colaterais: insônia, depressão, elevação nos testes de função hepática, elevação na creatinina sérica. Pode ser menos potente se o RNA do HIV no início do tratamento for > 100.000 cópias/ml. Requer meio gástrico ácido para absorção adequada. Deve ser tomado junto às refeições. Uso contraindicado com inibidores de bomba de prótons. Outros medicamentos antiácidos e de inibidores de H2, se utilizados por pacientes em uso de rilpivirina, devem ser tomados em horário específico.
	Intelence Janssen Therapeutics Genérico: Etravirine	2 Pílulas de 100 mg duas vezes ao dia.	Efeitos colaterais: Reações cutâneas severas, casos de síndrome de Stevens-Johnson, reações de hipersensibilidade. Descontinuar o uso caso haja brotoejas severas. Deve ser ingerido após a refeição. Intelence não deve ser administrado com os seguintes antirretrovirais: Tipranavir/ritonavir, fosamprenavir/ritonavir, atazanavir/ ritonavir; inibidores da protease que não contenham ritonavir e os INNT.
	Rescriptor ViiV Healthcare Genérico: Delavirdine mesylate	2 Pílulas de 100 mg duas vezes ao dia.	Efeitos colaterais: Erupção cutânea, dor de cabeça, fadiga, náuseas, elevação de enzimas hepáticas. Deve ser tomado uma hora antes ou depois de tomar Videx® ou antiácidos. Eleva os níveis no sangue de alguns inibidores de protease. Notifique seu médico caso haja erupção cutânea. Pode ser ingerido de estômago vazio.

	Sustiva Bristol-Myers Squibb (também vendido sob o nome Stocrin em alguns países) Genérico: efavirenz	1 Pílula de 600 mg uma vez ao dia ou 3 pílulas de 200 mg uma vez ao dia.	Efeitos colaterais: Sintomas relacionados com o sistema nervoso (SNC): enjôos, sonolência, insônia, alucinações, falta de concentração, sensação de instabilidade e erupção cutânea. Tomar Sustiva® antes de dormir par minimizar os possíveis efeitos colaterais. Pode reduzir os níveis de alguns IP e aumentar outros no sangue. Rifampin e clarithromycin reduzem os níveis de Sustiva®. Evitar consumo de álcool e tarefas de concentração. Mulheres devem praticar o controle de natalidade devido ao risco de dano fetal. Evite comidas com altas taxas de gordura. Preferencialmente deve ser ingerido de estômago vazio.
	Viramune Boehringer-Ingelheim Genérico: Nevirapine	1 Pílula de 200 mg duas vezes ao dia. Disponível em gotas.	Efeitos colaterais: Erupção cutânea, problemas estomacais, dor de cabeça, baixa contagem de leucócitos, elevação das enzimas hepáticas. Dosagem inicial: 1 Pílula de 200 mg 1 vez ao dia durante os primeiros 14 dias. Diminui os níveis dos IP. Notifique seu médico caso haja erupção cutânea. Pode ser ingerido de estômago vazio. As enzimas hepáticas devem ser controladas, especialmente durante a gravidez. Quando iniciar o tratamento com Viramune® ter precaução com as contagens de células T. Não é recomendável a mulheres que tenham contagens superiores a 250 células e homens superiores a 400 células.

Inibidores da protease (IP)

	Aptivus Boehringer-Ingelheim Genérico: tipranavir	2 Pílulas de 250 mg com 2 pílulas de 100 mg de Norvir® duas vezes ao dia.	Efeitos colaterais: Náusea, vômito, diarreia, erupção cutânea. Deve ser ingerido de estômago cheio. Não recomendado em insuficiência hepática moderada a grave. Aptivus pode ocasionar hemorragia intracraniana. Insuficiência hepática. Consulte imediatamente seu médico se apresentar sangramento de maneira distinta ou sem causa aparente. Precaução em alérgicos a sulfas. Funciona melhor quando combinado com Fuzeon®. Somente para pacientes com experiência em tratamentos. Deve ser ingerido de estômago cheio.
	Crixivan Merck & Co. Genérico: indinavir sulfate	2 Pílulas de 400 mg com 1 ou 2 Pílulas de Norvir® duas vezes ao dia.	Efeitos colaterais: Cálculos renais (pode ser apresentado como dor nas costas ou flanco), elevação nos níveis de bilirubina (pigmento biliar), erupção cutânea, pele seca, queda de cabelo, náuseas e diarreia. Tomar com água (6 a 8 copos de água por dia) para evitar cálculos renais. Junto com Norvir® pode ser ingerido de estômago vazio. Há várias interações medicamentosas, consulte seu médico. Não é recomendado sua combinação com atazanavir.
	Invirase La Roche Genérico: saquinavir mesylate	2 Pílulas de 500 mg com 1 Pílula de 100 mg de Norvir® duas vezes ao dia.	Efeitos colaterais: Náusea, diarreia, gás, dor abdominal, dor de cabeça. Ingerir com alimentos ou dentro de duas horas após a ingestão. Invirase® não deve ser utilizado sem o Norvir® Ler interações de Norvir®.
	Kaletra Laboratorios Abbott Genérico: 200 mg de lopinavir + 50 mg de ritonavir (também vendido sob o nome Aluvia em some countries)	4 Pílulas uma vez ao dia ou 2 duas vezes ao dia.	Efeitos colaterais: evacuações moles, diarreia, náuseas, vômito, sensação de cansaço ou debilidade. Este medicamento contém Norvir® - apresenta muitas interações medicamentosas. Precaução em pacientes co-infectados com hepatite B ou C. Não há restrições alimentícias. As Pílulas não necessitam de refrigeração. A dose de uma vez ao dia só é recomendada para pacientes sem experiência prévia em tratamentos. Caso o tratamento contenha Sustiva® ou Viramune®, a dose de Kaletra deve ser modificada. A dose de duas vezes ao dia só é recomendada para pacientes que tenham experiência em tratamentos e fracassaram com outros medicamentos. Caso o tratamento contenha Sustiva® ou Viramune®, a dose de Kaletra deve ser modificada.
	Lexiva ViiV Healthcare Genérico: Fosamprenavir (também vendido sob o nome Telzir em alguns países)	2 Pílulas de 700 mg duas vezes ao dia ou, 1 Pílula de 700 mg com 1 Pílula de Norvir® de 100 mg duas vezes ao dia ou, 2 Pílulas de 700 mg com uma Pílula de Norvir® de 100 mg uma vez ao dia.	Efeitos colaterais: diarreia, náuseas, vômito, erupção cutânea, dor de cabeça, diabetes. Pode ser ingerido de estômago vazio. A dose combinada com Norvir® é para pacientes com experiência em IP e a dose recomendada é duas vezes ao dia. Lexiva® contém compostos derivados de sulfas.
	Norvir Laboratorios Abbott Genérico: ritonavir	6 Cápsulas de gel de 100 mg duas vezes ao dia. Disponível em gotas. Aprovado também em doses pediátricas (1 mês a 2 anos de idade).	Efeitos colaterais: Náusea, diarreia, dor abdominal, fraqueza, enjoos, adormecimento ao redor da boca, alterações de gosto, aumenta os níveis de triglicerídeos e colesterol. Deve ser ingerido de estômago cheio. Norvir® interage com outros medicamentos. Separe a dose de Videx® em pelo menos 2 horas. Refrigeração. Caso seja exposto à temperatura ambiente, consumir dentro de 30 dias.
	Prezista Janssen Therapeutics Genérico: darunavir	2 Pílulas de 300 mg com 1 Pílula de Norvir® de 100 mg, duas vezes ao dia.	Efeitos colaterais: Náusea, diarreia, dor de cabeça, inflamação da garganta e nariz (sintomas parecidos a um resfriado). Em alguns casos, erupção cutânea moderada a grave. Pode causar aumentos de lipídeos e glicose (açúcar) no sangue. Precaução em pacientes com hemofilia e pacientes alérgicos às sulfas. Deve ser ingerido de estômago cheio (não importando a quantidade ou qualidade dos alimentos). Aprovado somente para pacientes com experiência prévia em tratamentos anti-HIV. Pode ser conservado em temperatura ambiente.
	Reyataz Bristol-Myers Squibb Genérico: atazanavir	2 Cápsulas de 200 mg uma vez ao dia. 1 cápsula de 300 mg com 1 cápsula de Norvir® uma vez ao dia, para pacientes com experiência em tratamentos.	Efeitos colaterais: Hiperbilirrubinemia (reversível com a suspensão do medicamento), alterações do ritmo cardíaco, hiperglicemia, náuseas, vômito, diarreia, febre, dor de cabeça, adormecimentos e sensação de formigamento em mãos e pés, dor articular, cálculos renais. Deve ser ingerido de estômago cheio. Diferente de outros IP, Reyataz® não altera os lipídeos no sangue. Quando ingerido junto com Sustiva® ou Viread®, adicionar Norvir® ao tratamento com Reyataz®. Nesta dupla, Reyataz® deve ser reduzido a 300 mg ao dia (Reyataz® 300 mg / Norvir® 100 mg). Não combinar Reyataz® com Crixivan®. Ingeri-lo com 2 horas de diferença de antiácidos, 10 horas depois dos antagonistas H2 e não ingerilo com os inibidores da bomba de prótons.
	Viracept ViiV Healthcare Genérico: nelfinavir	2 Pílulas de 625 mg ou 5 Pílulas de 250 mg duas vezes ao dia. Disponível em fórmula em pó.	Efeitos colaterais: diarreia, náuseas, erupção cutânea, dor de cabeça, câimbras estomacais. Ingerir com alimentos melhora sua absorção. Possui certas interações medicamentosas. Advertência: até novo pronunciamento, devido a impurezas na Pílula não é recomendável que crianças comecem o tratamento e nem mulheres grávidas.

Inibidor da fusão; inibidor da entrada

	Fuzeon Roche y Trimeris, Inc. Genérico: enfuvirtide	1 Injeção (1ml/cc) subcutânea a cada 12 horas.	Reação alérgica no local da injeção: coceira, inchaço, vermelhidão, dor, endurecimento (geralmente, a reação se repete no seguinte local da injeção). Reação alérgica generalizada: problemas para respirar, febre, vômitos, sangue na urina, inchaço nos pés, pneumonia, constipação, pancreatite, dor muscular, diminuição de apetite, observados em combinação com outros antirretrovirais. Não há restrições alimentícias. As ampolas de Fuzeon® e de água esterilizada podem ser conservadas a temperatura ambiente, 59F a 86F (15C-30C). Se a temperatura ambiente for superior, é recomendável guardar Fuzeon® em refrigeração; uma vez combinado com água esterilizada, pode ser conservado em geladeira por 24hrs. Fuzeon® somente está aprovado para seu uso em pacientes experientes em terapia antirretroviral.
	Selzentry ViiV Healthcare Genérico: maraviroc (também vendido sob o nome Censenti em alguns países)	1 Pílula de 150 mg duas vezes ao dia ou, 1 Pílula de 300 mg duas vezes ao dia ou, 2 Píulas de 300 mg duas vezes ao dia (a dose prescrita dependerá de sua combinação com outros medicamentos).	Efeitos colaterais: tosse, febre, resfriados, brotoejas, dor muscular e articular, dor de estômago e enjôos. Menos freqüente: problemas no fígado, infartos do coração, hipotensão postural, riscam teórico de desenvolvimento de infecções ou câncer. Pode ser ingerido de estômago vazio. Combinar com outro retroviral. Aprovado para pacientes adultos com experiência prévia e fracasso em tratamentos que tenham um HIV-1 com tropismo CCR5 detectável e resistente a múltiplos antirretrovirais. Realizar análise de tropismo antes do uso de Selzentry para determinar receptor celular (CCR5 ou CXCR4).

Inibidor da integrase

	Isentress Merck & CO. Inc. Genérico: raltegravir	1 Pílula de 400 mg duas vezes ao dia.	Efeitos colaterais: diarreia, náuseas, dor de cabeça. Menos comuns: aumento da creatinoquinase (CK) junto com miopatia e rabdomiólise (destruição muscular). Pode ser ingerido de estômago vazio. Combinar com outros antirretrovirais. Aprovado para pacientes adultos com experiência prévia e fracasso em tratamentos e com cepas de HIV-1 resistentes a múltiplos antirretrovirais. Precaução quando administrado com indutores da enzima UGT (por ex.: rifampin) porque os níveis de raltegravir diminuem.
---	---	---------------------------------------	---

Combinações

	Atripla Bristol-Myers Squibb e Gilead Sciences Combinação de 600 mg de efavirenz + 200 mg de emtricitabina + 300 mg de tenofovir DF (1 INTR + 2 INTR)	1 Pílula uma vez ao dia.	Efeitos colaterais: Para informações sobre os efeitos indesejáveis leia Sustiva® (efavirenz), Emtriva® (emtricitabine) e Viread® (tenofovir DF). Deve ser ingerido com alimentos e antes de dormir para minimizar a aparição de potenciais efeitos secundários. Conservar a temperatura ambiente.
	Combivir ViiV Healthcare Combinação de 150 mg de lamivudina + 300 mg de zidovudine (2 INTR)	1 Pílula duas vezes ao dia.	Para mais informações sobre efeitos colaterais, leia Retrovir® (AZT) e Epivir® (3TC). Tenha cuidado com a anemia. As combinações, já estabelecidas não devem ser prescritas em pacientes que necessitam de ajustes na dosagem. Pode ser ingerido de estômago vazio, porém, quando ingerido com alimentos, as moléstias estomacais são reduzidas.
	Complera Gilead Sciences e Janssen Therapeutics (contém: rilpivirina 25 mg + tenofovir DF 300 mg + emtricitabina 200 mg, um NNRTI e dois NRTIs)	1 Pílula uma vez ao dia.	Os efeitos colaterais mais comuns são: dificuldade para dormir, sonhos anormais, dor de cabeça, tonturas, diarreia, náuseas, erupções cutâneas, cansaço, depressão, vômitos e dor de estômago. Efeitos colaterais menos comuns: problemas renais, problemas ósseos (inclui dor óssea, amolecimento ou enfraquecimento, o que pode levar a fraturas), alterações na gordura corporal. Consulte a seção “Quais são os efeitos colaterais?” de Edurante, Viread e Emtriva para possíveis efeitos secundários. Complera é aprovada apenas para pessoas com HIV iniciando o tratamento do HIV pela primeira vez. Se você está tomando Complera, você não deve tomar outros medicamentos que contenham emtricitabina ou lamivudina.
	Epzicom ViiV Healthcare Combinação de 600 mg de abacavir + 300 mg de lamivudina (2 INTR) (também vendido sob o nome Kivexa em alguns países)	1 Pílula uma vez ao dia.	Para mais informações sobre efeitos colaterais, leia Ziagen® y Epivir®. Pode ser ingerido de estômago vazio. Este medicamento contém Ziagen® (abacavir) e pode causar séria reação alérgica (leia as recomendações para Ziagen®).
	Trizivir ViiV Healthcare Combinação de zidovudina 300 mg + lamivudina 150 mg + abacavir 300 mg. (3 INTR)	1 Pílula duas vezes ao dia.	Para mais informações sobre efeitos colaterais, veja Retrovir® (AZT), Epivir® (3TC) e Ziagen® (abacavir). Este medicamento contém Ziagen® (abacavir) e pode causar uma séria reação alérgica (leia as recomendações para Ziagen®). Pode ser ingerido de estômago vazio.
	Truvada Gilead Sciences Combinação de 300 mg tenofovir DF + 200 mg de emtricitabina (2 INTR)	1 Pílula uma vez ao dia.	Para mais informações sobre efeitos colaterais, veja Viread® e Emtriva®. Pode ser ingerido de estômago vazio.